

FOLPET 40 + METALAXIL 10

Fungicida

Polvo mojable (Wp)

Composición:	Folpet 40% p/p (400 grs/Kg) Metalaxil 10% p/p (100 grs/Kg) “contiene caolín”
Formulación:	Polvo mojable (WP)
Envases:	1 y 5 Kg.
Nº Registro:	21.866
Clasificación Toxicológica:	Xn, N (A,A,C)



FOLPET 40 + METALAXIL 10 Asociación de folpet y metalaxil, que se caracteriza por su actividad fúngica sistémica y por contacto, y por su larga acción protectora. Se presenta en Polvo mojable.

Aplicaciones Autorizadas:

- **Vid de vinificación:** contra mildiu y acción complementaria contra black-rot.

Dosis y modo de empleo :

Aplicar en pulverización normal a la dosis de 0,20-0,25% (200-250 g/100 L) y con un gasto máximo de 1500 Lt de caldo por Ha. (equivalente a 1.5 Kg de Folpet y aplicación).

El último tratamiento se dará a los 14 días del final de la floración, prosiguiendo el resto de la campaña con tratamientos de cobertura con productos preventivos.

Plazo de seguridad:

No procede plazo de seguridad entre la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero, o entrada de ganados.

Observaciones:

Su eficacia se reduce un 10% en suelos con más del 10% de materia orgánica. No es recomendable su aplicación en suelos arenosos, muy ligeros, mal drenados o pobres en materia orgánica. En caso de levantar el cultivo antes de tiempo, debe darse una labor profunda antes de establecer otro.

Síntomas de intoxicación:

-Irritación de ojos, piel y vías respiratorias.
-Sensibilización, vómitos, diarrea, debilidad, alteraciones cardio-respiratorias.
-Puede haber neumonía por aspiración.

Primeros auxilios:

-Retire a la persona de la zona contaminada
-Quite la ropa manchada o salpicada.
-Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
-Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
-En caso de ingestión, NO provoque el vómito.
-Mantenga al paciente en reposo.
-Conserve la temperatura corporal.
-Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
-Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
-Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos:

-Lavado gástrico, carbón activado, catártico salino (si no hay diarrea)
-Tratamiento sintomático.

Gestión de envases:

Enjuague energéticamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema integrado de gestión SIGFITO. (símbol sigfito)